

FAQs

Que dose devo utilizar?¹²

Reconcile® é administrado uma vez por dia, ideal para uma boa adesão ao tratamento.

É administrado por via oral numa dose única diária de 1 a 2 mg/kg de peso corporal, de acordo com a tabela seguinte:

PESO CORPORAL (KG)	DOSAGEM DOS COMPRIMIDOS (MG)	Nº COMPRIMIDOS POR DIA
4 - 8	Reconcile® 8mg comprimidos	1
> 8 - 16	Reconcile® 16mg comprimidos	1
> 16 - 32	Reconcile® 32mg comprimidos	1
> 32 - 64	Reconcile® 64mg comprimidos	1

Tenho de administrar os comprimidos com alimentos?¹²

Os comprimidos Reconcile® podem ser administrados com ou sem alimentos. Os comprimidos têm um sabor agradável e a maioria dos cães tomarão o comprimido quando dado pelo dono.

Quanto tempo devo esperar até observar uma resposta?¹²⁻¹³

É de esperar uma melhoria clínica com o medicamento no prazo de 1 a 2 semanas. Caso não se observe melhoria no prazo de 4 semanas, o tratamento deve ser reavaliado.

Existem alguns cães em que não se deva utilizar Reconcile®?

Reconcile® está contraindicado para utilização em cães com epilepsia ou historial de convulsões, nem deve ser administrado a cães com uma hipersensibilidade conhecida à fluoxetina, a outros ISRS ou a qualquer um dos excipientes.

A segurança de Reconcile® não foi determinada em cães com idade inferior a 6 meses ou com peso inferior a 4 kg.

A segurança do medicamento veterinário não foi estabelecida em gestantes ou lactantes, pelo que a sua utilização não é recomendada durante a gestação nem no período de aleitamento.

Que efeitos secundários poderei observar com Reconcile®?¹²

Os eventos adversos mais comuns, notificados por ordem decrescente de frequência são: diminuição do apetite (incluindo anorexia), letargia, distúrbios do trato urinário (cistite, incontinência urinária, retenção urinária, estrangúria), falta de coordenação, desorientação, perda de peso/perda de forma, midríase, respiração ofegante, convulsões e vômitos.¹² Para minimizar o risco de reações adversas, não se deve exceder a dose recomendada.

Posso utilizar Reconcile® juntamente com outros medicamentos?¹²

Reconcile® não deve ser administrado concomitantemente com medicamentos veterinários que reduzam o limiar de convulsão (por exemplo, fenotiazinas, tais como, a acepromazina ou a clorpromazina).

Não utilizar o produto juntamente com outros agentes serotoninérgicos (por exemplo, sertralina) e inibidores da monoaminoxidase (IMAOs) [por exemplo, cloridrato de selegilina (L-deprenil), amitraz] ou aminas tricíclicas (TCAs) (por exemplo, amitriptilina e clomipramina).

Deve ser cumprido um período de eliminação de 6 semanas após a interrupção do tratamento com Reconcile® antes da administração de qualquer medicamento veterinário que possa interagir adversamente com a fluoxetina ou o seu metabolito, norfluoxetina.

Adicionalmente, consta do RCM¹²: "A fluoxetina é metabolizada principalmente pelo sistema enzimático P-450, sendo a isoenzima especificamente envolvida no cão desconhecida. Assim, a fluoxetina deve usar-se com precaução em conjunto com outros medicamentos veterinários.¹¹

Os comprimidos não foram avaliados com medicamentos que afetam o sistema enzimático do citocromo P450. Reconcile®, deve ser utilizado com precaução quando administrados concomitantemente com qualquer medicamento que afete o sistema enzimático do citocromo P450 (por exemplo, cetoconazol).

Preciso realizar frequentemente análises ao sangue a um paciente que esteja a realizar tratamento com Reconcile®?¹²

Não existe nenhum requisito no RCM de Reconcile® para avaliação frequente de quaisquer parâmetros hematológicos ou bioquímicos em doentes que estejam a realizar tratamento com Reconcile®. Reconcile® não causou efeitos marcados ou consistentes no hemograma, bioquímicas ou urinálise num estudo de segurança com a duração de um ano em cães.¹¹ Tal como para qualquer doente que realize um tratamento, o critério clínico deverá ser usado para monitorizar a resposta do cão ao tratamento e verificar a existência de reações adversas.

