



Medicamento sujeito a
receita médico-veterinária

Com Z-Itch®, a temporada de insetos já não é um problema

- Proteção avançada contra as picadas que incomodam o seu cavalo.
- Defesa eficaz em ambientes com alta presença de insetos.
- Ideal para cavalos e burros sensíveis durante a temporada de dermatite estival.
- Fórmula não aquosa que oferece maior resistência à água e durabilidade.
- Aplicação fácil com frasco doseador para administrar a dose certa.
- Medicamento sujeito a receita médico-veterinária.
- A primeira Permetrina registada para cavalos e burros.

✓ Composição (por ml):

Permetrina (Cis:Trans 80:20) 40 mg

✓ Posologia e via de administração:

- O medicamento veterinário é uma solução pronta a usar, de unção contínua, que deve ser administrada a uma taxa de 4 mg/kg peso corporal, equivalente a 1 ml por 10 kg peso corporal a um máximo de 40 ml. Indicações de dosagem:

Peso corporal (kg)	100	200	250	300	>400
Volume da dose (ml)	10	20	25	30	40

- Aplicar a medida em proporções aproximadamente iguais na crina e garupa, evitando a área da sela. O tratamento deve começar no início da estação da dermatite estival. O tratamento uma vez por semana deve ser suficiente para a maioria dos cavalos e burros.
- Se os cavalos e os burros precisarem de ser preparados, aplicar o medicamento veterinário depois da preparação (grooming).



✓ Indicações terapêuticas:

- Para administração como apoio no controlo da dermatite estival equina devido ao seu efeito repelente sobre o inseto picador *Culicoides* spp.

✓ Forma e Apresentação:

- Líquido - Pour on. Com dispositivo doseador.
- 250 ml (6 doses / semanas).

✓ Contraindicações:

- Não administrar em caso de hipersensibilidade à substância ativa ou a algum dos excipientes. Não administrar a equídeos que sofram de doença hepática.

⊕ **Advertências especiais:**

Advertências especiais:

Acredita-se que a dermatite estival equina é causada por uma hipersensibilidade às picadas de insetos voadores, por exemplo, as espécies de Culicoides. Além do tratamento, outras medidas devem ser tomadas para reduzir a exposição a tais insetos quando for exequível. Pode ser apropriado para os proprietários procurarem aconselhamento médico-veterinário sobre o tratamento de cavalos com dermatite estival equina. Também se recomenda que os proprietários procurem o médico veterinário em casos graves de dermatite estival equina e em casos de dermatite estival equina que não respondem ao tratamento.

O banho ou exposição à chuva após a aplicação do medicamento veterinário pode afetar a proteção.

O uso desnecessário de antiparasitários ou o uso divergente das instruções dadas no folheto informativo pode aumentar a pressão de seleção da resistência e levar a uma redução da eficácia. A decisão de utilizar o medicamento veterinário deve basear-se na confirmação da espécie e da carga parasitária, ou do risco de infestação com base nas suas características epidemiológicas, especificamente para cada animal.

Precauções especiais para uma utilização segura nas espécies-alvo:

Exclusivamente para uso externo.

O medicamento veterinário não pode ser aplicado à frente das orelhas.

Aplicar com precaução de forma a evitar o contacto com os olhos.

No caso de derrame acidental nos olhos do animal, o olho afetado deve ser muito bem lavado, imediatamente, com quantidade abundante de água limpa e consultar o médico veterinário. Não tratar a área da sela.

Procedimento para o teste de adesivos:

Usando luvas de proteção, aplicar uma pequena quantidade do medicamento veterinário (cerca de 1 ml) numa área identificável na base do pescoço do animal e esfregar na pele com uma zaragatoa.

Embrulhar a zaragatoa usada nas luvas e eliminá-la em segurança.

Nas 24 e 48 horas após a aplicação, examinar a área onde o medicamento veterinário foi aplicado e observar a pele para verificar sinais de reação (vermelhidão, inchaço, descamação ou exsudação).

Se ocorrer uma reação após o teste do adesivo, não utilizar o medicamento veterinário no animal.

Se ocorrerem reações adversas, o tratamento deve ser imediatamente interrompido. Qualquer irritação cutânea resultante é de curta duração.

Precauções especiais a adotar pela pessoa que administra o medicamento veterinário aos animais:

No caso de derrame acidental na pele ou nos olhos, lavar imediatamente com água.

Lavar as mãos após a aplicação.

Aplicar em áreas bem ventiladas.

Garanta que a área tratada está seca antes de permitir o contacto da pele com o animal tratado. Em caso de exposição acidental, procurar imediatamente aconselhamento médico e mostrar o folheto da embalagem ou o rótulo ao médico.

Gestação e lactação:

Pode ser administrado durante a gestação e lactação.

Sobredosagem:

Os sinais de toxicidade em equídeos consistem em tremores, hiperexcitabilidade, salivação, coreoatetose e paralisia. Os sinais desaparecem rapidamente e os animais recuperam, geralmente dentro de uma semana. Não existe um antídoto específico, mas pode ser administrado tratamento sintomático se for considerado necessário.

Eventos adversas

Cavalos e burros.

Frequência indeterminada (A frequência não pode ser calculada a partir dos dados disponíveis):

Reação no local de aplicação¹, Irritação no local de aplicação¹, Perda de pelo no local de aplicação¹, Alopecia no local da aplicação¹.

¹Alguns cavalos, particularmente aqueles de pele fina do tipo árabe, podem apresentar sinais de irritação ou hipersensibilidade da pele ao

tratamento com o medicamento veterinário. Nestes animais, recomenda-se um teste de alergia cutânea na base do pescoço.

Classificação dos medicamentos veterinários

Medicamento veterinário sujeito a receita médico-veterinária.

⊕ **Titular da AIM:**

Nº AIM: 1377/01/20RFVPT

TAC: Floris Holding BV, Kempelandstraat 33 5262 GK Vught, Países Baixos